



Περίοδος καλλιέρ- γειας σε εβδομάδες	Φως ανά ημέρα σε ώρες	Terra Vega ml/ 10 λίτρα	Terra Flores ml/ 10 λίτρα	RHIZOTONIC ml/ 10 λίτρα	CANNAZYM ml/ 10 λίτρα	CANNABOOST ml/ 10 λίτρα	PK 13/14 ml/ 10 λίτρα	EC + σε mS/cm	Συνολική EC σε mS/cm
---	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------

ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ

Έναρξη / ριζώμα φυτών - (3 - 5 ημέρες)
Βρέξτε το υπόστρωμα

<1

18

15-35

-

40

-

-

-

0.4-0.8

0.8-1.2

Βλαστική φάση I - Αύξηση φυτών σε όγκο

0-3¹

18

30-50

-

20

25

-

-

0.7-1.1

1.1-1.5

Βλαστική φάση II - Έως τη στασιμότητα της
αύξησης μετά την καρποφορία ή τον σχηματισμό ανθέων

2-4²

12

35-55

-

20

25

20⁵

-

0.9-1.3

1.3-1.7

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΑΝΘΙΣΗ

Αναπαραγωγική φάση I - Αύξηση ανθέων και
καρπών σε μήκος. Ολοκλήρωση αύξησης σε ύψος

2-3

12

-

50-70

5

25

20-40

-

1.2-1.6

1.6-2.0

Αναπαραγωγική φάση II - Ανάπτυξη ανθέων
ή καρπών σε όγκο (πλάτος)

1

12

-

50-70

5

25

20-40

15

1.5-1.9

1.9-2.3

Αναπαραγωγική φάση III - Ανάπτυξη ανθέων
ή καρπών σε μάζα (βάρος)

2-3

12

-

40-60

5

25

20-40

-

1.0-1.4

1.4-1.8

Αναπαραγωγική φάση IV - Ωρίμανση ανθέων
ή καρπών

1-2

10-12³

-

-

-

25-50⁴

20-40

-

0.0

0.4

- Αυτή η περίοδος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό φυτών ανά m². Τα μητρικά φυτά παραμένουν στη φάση αυτή έως το τέλος (6-12 μήνες).
- Η μετάβαση από τις 18 στις 12 ώρες κυμαίνεται ανάλογα με την ποικιλία. Εμπειρικά, συνήθως γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.
- Μειώστε τις ώρες φωτός αν η ωρίμανση είναι πολύ γρήγορη. Προσοχή στην αύξηση της σχετικής υγρασίας.
- Διπλασιάστε τη δόση CANNAZYM σε 50 ml/10 λίτρα αν το υπόστρωμα έχει επαναχρησιμοποιηθεί.
- Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

EC: Η τιμή της EC μετριέται σε mS/cm, όπου EC νερού = 0,0 στους 25°C, και σε pH 6,0.

Προσθέστε την EC του νερού που χρησιμοποιείτε στη συνιστώμενη EC!

Η συνολική EC στο παράδειγμα υπολογίστηκε με EC νερού 0,4.

pH: Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5,8 και 6,2.

Η προσθήκη pH- μπορεί να αυξήσει την EC.

Προσθέστε pH- grow στη βλαστική φάση για μείωση του pH.

Προσθέστε pH- bloom στην αναπαραγωγική φάση για μείωση του pH.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιέργητες να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βέλτιστη τακτική λίπανσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποτίσματος κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο www.canna-gr.com.

CANNA
The solution for growth and bloom