



	Περίοδος καλλιέρ- γειας σε εβδομάδες	Φως ανά ημέρα σε ώρες	COCO ml A/ 10 λίτρα ml B/ 10 λίτρα	RHIZOTONIC ml/ 10 λίτρα	CANNAZYM ml/ 10 λίτρα	CANNABOOST ml/ 10 λίτρα	PK 13/14 ml/ 10 λίτρα	EC + σε mS/cm	Συνολική EC σε mS/cm
	<1	18	15-25	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
	0-3 ¹	18	20-30	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
νθέων	2-4 ²	12	25-35	20	25	20 ⁵	-	1.1-1.5	1.5-1.9
ΚΑΙ	2-3	12	30-40	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
ων	1	12	30-40	5	25	20-40	15	1.6-2.0	2.0-2.4
ων	2-3	12	20-30	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
θέων	1-2	10-12 ³	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4

- Αυτή η περίοδος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό φυτών ανά m². Τα μητρικά φυτά παραμένουν στη φάση αυτή έως το τέλος (6-12 μήνες).
- Η μετάβαση από τις 18 στις 12 ώρες κυμαίνεται ανάλογα με την ποικιλία. Εμπειρικά, συνήθως γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.
- Μειώστε τις ώρες φωτός αν η ωρίμανση είναι πολύ γρήγορη. Προσοχή στην αύξηση της σχετικής υγρασίας.
- Διπλασιάστε τη δόση CANNAZYM σε 50 ml/10 λίτρα αν το υπόστρωμα έχει επαναχρησιμοποιηθεί.
- Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

EC: Η τιμή της EC μετρείται σε mS/cm, όπου EC νερού = 0.0 στους 25°C, και σε pH 6.0.
Προσθέστε την EC του νερού που χρησιμοποιείτε στη συνιστώμενη EC!
Η συνολική EC στο παράδειγμα υπολογίστηκε με EC νερού 0.4.

pH: Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 6,2.
Η προσθήκη pH- μπορεί να αυξήσει την EC.
Προσθέστε pH- grow στη βλαστική φάση για μείωση του pH.
Προσθέστε pH- bloom στην αναπαραγωγική φάση για μείωση του pH.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιεργητές να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βέλτιστη τακτική λίπανσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποτίσματος κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο www.canna-gr.com.

CANNA
The solution for growth and bloom