

BIOCANNA

The Bio Solution for growth and bloom

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



		Περίοδος καλλιέρ- γειας σε εβδομάδες	Bio Vega ml/ 10 λίτρα	Bio Flores ml/ 10 λίτρα	Bio RHIZOTONIC ml/ 10 λίτρα	Bio BOOST ml/ 10 λίτρα
ΑΥΞΗΣΗ	ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ					
	Έναρξη / ριζώμα φυτών - (3 - 5 ημέρες) Βρέξτε το υπόστρωμα	<1	10-15	-	40	-
	Βλαστική φάση I - Αύξηση φυτών σε όγκο	3-12	15-20	-	20	-
ΑΝΟΙΞΗ	Βλαστική φάση II - Συνέχιση βλαστικής ανάπτυξης και έναρξη σχηματισμού ανθών.	2-4	20-25	-	5	20 ¹
	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ					
	Αναπαραγωγική φάση I - Αύξηση των ανθών και καρπών σε μέγεθος. Ολοκλήρωση βλαστικής ανάπτυξης.	2-3	-	30-40	5	20-40
	Αναπαραγωγική φάση II - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε όγκο (πλάτος)	1	-	30-40	5	20-40
	Αναπαραγωγική φάση III - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε μάζα (βάρος)	2-3	-	20-30	5	20-40
	Αναπαραγωγική φάση IV - Ωρίμανση ανθέων ή καρπών	1-2	-	-	-	20-40

1. Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

pH: Το pH κατά κανόνα δεν χρειάζεται διόρθωση. Το σκληρό νερό [pH > 7,5] αποτελεί εξαίρεση. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να διορθώνετε το pH σε 6,0 - 6,5 χρησιμοποιώντας Οργανικό Οξύ [ή pH- Grow]. Ρυθμίστε το pH του νερού σας 24 ώρες πριν προσθέσετε το BIOCANNA.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιεργητές να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βέλτιστη τακτική λίπανσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποτίσματος κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο www.canna-gr.com/biocanna.