



ΑΥΓΗΣΗ

ΑΝΟΙΞΗ

ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

	Περιόδος καλλιέργειας σε εβδομάδες	Φως ανά ημέρα σε ώρες	Aqua Vega	Aqua Flores	RHIZOTONIC	CANNAZYM	CANNABOOST	PK 13/14	EC +	Συνολική EC
Έναρξη / ρίζωμα φυτών - (3 - 5 ημέρες) Βρέστε το υπόστρωμα	<1	18	15-25	-	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
Βλαστική φάση I - Αύξηση φυτών σε όγκο	0-3 ¹	18	20-30	-	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
Βλαστική φάση II - Έως τη στασιμότητα της αύξησης μετά την καρποφορία ή τον σχηματισμό ανθέων	2-4 ²	12	25-35	-	20	25	20 ⁵	-	1.2-1.6	1.6-2.0

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ

Αναπαραγωγική φάση I - Αύξηση ανθέων και καρπών σε μήκος. Ολοκλήρωση αύξησης σε ύψος	2-3	12	-	30-40	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
Αναπαραγωγική φάση II - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε όγκο (πλάτος)	1	12	-	30-40	5	25	20-40	15	1.6-2.0	2.0-2.4
Αναπαραγωγική φάση III - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε μάζα (βάρος)	2-3	12	-	20-30	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
Αναπαραγωγική φάση IV - Ωρίμανση ανθέων ή καρπών	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4

1. Αυτή η περιόδος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό φυτών ανά m². Τα μητρικά φυτά παραμένουν στη φάση αυτή έως το τέλος (6-12 μήνες).
2. Η μετάβαση από τις 18 στις 12 ώρες κυμαίνεται ανάλογα με την ποικιλία. Εμπειρικά, συνήθως γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.
3. Μειώστε τις ώρες φωτός αν η ωρίμανση είναι πολύ γρήγορη. Προσοχή στην αύξηση της σχετικής υγρασίας.
4. Διπλασιάστε τη δόση CANNAZYM σε 50 ml/10 λίτρα αν το υπόστρωμα έχει επαναχρησιμοποιηθεί.
5. Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

EC: Η τιμή της EC μετριέται σε mS/cm, όπου EC νερού = 0,0 στους 25°C, και σε pH 6.0.

Προσθέστε την EC του νερού που χρησιμοποιείτε στη συνιστώμενη EC!

Η συνολική EC στο παράδειγμα υπολογίστηκε με EC νερού 0,4.

pH: Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5,2 και 6,2.

Η προσθήκη pH- μπορεί να αυξήσει την EC.

Προσθέστε pH-grow στη βλαστική φάση για μείωση του pH.

Προσθέστε pH-bloom στην αναπαραγωγική φάση για μείωση του pH.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιεργητές να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βελτίστηση τακτική λίπτωσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσόστωση υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποτίσματος κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο www.canna-gr.com.

CANNA
The solution for growth and bloom